



Bihoreau violacé



ID document

57651

Référence

45968

Date

21/12/2010

Titre

Bihoreau violacé

Légende

Bihoreau violacé (*Nyctanassa violacea*)- Estuaire du fleuve Muisne. Traditionnellement, tous les grands oiseaux aux pattes et bec longs associés à l'eau tels que les cigognes, les hérons, les ibis et les spatules appartiennent à l'ordre des Ciconiiformes. En Équateur, ce groupe est composé de 29 espèces vivant dans une grande diversité d'habitats, depuis les forêts de mangrove jusqu'aux páramos humides. Récemment, des expériences pratiquées sur l'ADN des Ciconiiformes ont démenti la classification précédente basée sur la morphologie, et suggèrent que les hérons et les ibis sont plus proches des pélicans que des cigognes.

Attention : pour toute utilisation de cette image, MENTIONNER IMPERATIVEMENT le copyright suivant © naturexpose.com / Olivier Dangles et François Nowicki. Pour toute utilisation de cette photo dans la presse ou dans l'édition, merci de vous adresser aux auteurs auprès du site www.naturexpose.com ou nous contacter à indigo@ird.

Auteur

Olivier Dangles et François Nowicki

Copyright

© naturexpose.com /Olivier Dangles et François Nowicki

Instructions spéciales

Photo recadrée / Original N° 45 738

Mots-clés

BIODIVERSITE, MONDE ANIMAL, OISEAU, OISEAU MARIN, SCIENCES DU MONDE ANIMAL